

OCHORENIA OBLIČIEK PRI DIABETE 2. TYPU


Stále existujú nenaplnené potreby pri súčasných možnostiach liečby ľudí s diabetom 2. typu a s ním súvisiacimi obličkovými komplikáciami.¹ Individuálny prístup k ochoreniu je stále potrebný.²



Diabetici podliehajú vyššiemu riziku rozvinutia obličkových ochorení ako ľudia bez diabetu.³




Približne 50% ľudí s diabetom 2. typu trpia nejakým ochorením obličiek.⁴



S postupným rozvojom ochorenia obličiek sa tieto stávajú menej efektívne, čím je následne ohrozené zdravie pacienta.



ednotlivé stupne poškodenia obličiek.⁵



AaAA1A AAAA.A1AAhAcA
AAzA1AA4A-AA1AA2A yAA.AAcAAhA



00R0000f00000005000if
0010000i0005000p00i0ff000000000if
005005000i00f0s0050D0i00ffff0000ff
00000R00f0R00R00000if
000p0i000000if00000i0D00of
0000000s0o000f0500i0D0f000i005f
00i005000if

000i005000005 National Kidney Foundation. *American Journal of Kidney Diseases*. 2007;49(2):S1-S179. 2. Inzucchi SE, et al. *Diabetologia*. 2012;55(6):1577-96. 3. International Diabetes Federation. *The Kidney*. p.15. 4. Thomas MC. *National Review of Nephrology*. 2016;12(2):73-81. 5. Gansevoort RT, et al. *The Lancet*. 2013;382:339-52.